



CATALOGUE  
**2014**

**BETTERAVE SUCRIÈRE,  
FOURRAGÈRE ET CHICORÉE**



**FLORIMOND  
DESPREZ**



## Rémi HENGUELLE, Directeur commercial

Avec la fin annoncée des quotas, planteurs et industriels devront être concurrentiels vis-à-vis des autres sources de sucre (canne à sucre, isoglucose,...).

Une des meilleures solutions pour atteindre cet objectif est d'augmenter la production par hectare avec le but d'atteindre 20 tonnes de sucre en 2020.

Entreprise indépendante et familiale depuis 1830, le groupe FLORIMOND DESPREZ, leader mondial de la semence de betteraves est à vos côtés pour relever ce défi. Initiateur et partenaire actif du programme Aker pour l'amélioration de la compétitivité de la betterave, FLORIMOND DESPREZ vous offre un choix important de variétés toujours plus performantes.




## La France betteravière

**26 000**  
producteurs  
betteraviers

**390 000 Ha**  
de betterave

**25** sucreries



## Une équipe dynamique à vos côtés

- 1 **Julien CARLE** - TÉL. 06 82 18 19 07  
Responsable Développement
- 2 **Emery LENS** - TÉL. 06 71 25 89 11  
Responsable Commercial
- 3 **Thierry LEJEUNE** - TÉL. 06 72 63 82 39  
Responsable Commercial
- 4 **Guillaume CLAY** - TÉL. 06 86 55 80 39  
Responsable Commercial Export
- 5 **Gérard DEROUERS** - TÉL. 06 74 44 29 57  
Chef Produit Betterave Fourragère et Chicorée
- 6 **Ludovic SIMONNEAU** - TÉL. 06 78 72 69 30  
Responsable Commercial
- 7 **Stéphane BEURION** - TÉL. 06 77 23 65 72  
Responsable Commercial
- 8 **Jean-Marie VION** - TÉL. 06 83 58 92 64  
Responsable Développement France
- 9 **Rémi HENGUELLE** - TÉL. 06 85 23 81 24  
Directeur Commercial
- 10 **Clémence TURPIN** - TÉL. 03 20 84 98 62  
Responsable Administration et Marketing





## La sélection des plantes de référence est réalisée



Lancé en 2012, AKER est sur les rails. La première étape consistant à faire le choix des 15 plantes de référence sur lesquelles le programme se bâtit est positive. Le programme AKER vise à améliorer la compétitivité de la betterave en France à l'horizon 2020 en doublant le rythme de croissance annuelle de son rendement en sucre/hectare (4 % vs 2 %), dans un contexte international marqué par l'augmentation de la demande mondiale en sucre et la prédominance de la canne à sucre. AKER s'inscrit dans le Programme d'Investissements d'Avenir initié par l'État dans le cadre de l'Agence Nationale de la Recherche.

Le programme est porté par 11 organismes, partenaires publics et opérateurs privés de la filière betterave sucrière française, dont Florimond Desprez qui en est l'opérateur et assure 58 % de son financement.



Betterave2020

### Élargir la variabilité

Le programme AKER consiste d'abord à élargir la variabilité génétique de la betterave en constituant une collection de gènes. Ensuite, AKER valorisera le matériel génétique obtenu en le croisant avec le matériel élite, de manière à produire de nouvelles variétés à haut potentiel, qui seront mises à disposition

de la filière. Les chercheurs se sont mis rapidement au travail sous la houlette de Bruno Desprez, président du Comité de Coordination, et l'année 2013 s'est focalisée sur le choix des 15 plantes de référence.

« Nous nous sommes adressés à 46 banques de gènes en Europe et aux États-Unis grâce aux bases de données Eurisco et GRIN-ARS », explique **Karine Henry**, sélectionneur Betteraves et Chicorée chez Florimond Desprez, et directrice scientifique du programme AKER. « Après un inventaire et une analyse de plus de 10 000 plantes de référence (sucrières cultivées, apparentées cultivées et de très nombreuses sauvages...), nous avons pu rassembler dès janvier 2013 les 3 000 plantes représentatives nécessaires au programme. Nous avons fait tourner des logiciels d'analyse de diversité qui nous ont permis de générer plusieurs jeux de 15 plantes de référence. Mais nous savons d'ores et déjà qu'avec 15 plantes, on couvre 100 % de la variabilité allélique disponible au sein du genre Beta et complémentaire des ressources génétiques déjà utilisées actuellement ».



De son côté, **Pierre Devaux**, directeur du Laboratoire de Biotechnologies chez Florimond Desprez, a caractérisé du point de vue moléculaire ces 3 000 plantes. « Pour cela, nous utilisons les marqueurs : SNP (Single Nucleotide Polymorphism) issu du matériel de sélection et DArT (Diversity Array Technology) issu de l'ensemble y compris du matériel sauvage ». Il poursuit : « Nous mesurons les différences et calculons des richesses alléliques et des distances génétiques, c'est-à-dire la diversité ».



### Un programme de longue haleine

« AKER est un programme de longue haleine », explique **Bruno Desprez**. « Nous devons tenir dans la durée jusqu'en 2020 et au-delà, sans décevoir, mais sans lasser ».

Le programme AKER apportera du nouveau matériel génétique, sans aucun doute, mais aussi des outils et des méthodes avant même cette échéance pour faire avancer collectivement la sélection génétique de la betterave, « afin de lui conserver toute sa place dans le peloton de tête des plantes cultivées ».

Les parasites de la racine sont les causes principales de pertes de rendement. Certaines sont parfois surnommées telles que le nématode à kystes. Le rhizoctone brun est visible très tôt en végétation, il provoque la pourriture de la racine et la mauvaise conservation des betteraves en silo. En usine il perturbera l'extraction du sucre.

## Le nématode à kystes de la betterave

[heterodera schachtii]

C'est un ravageur clandestin de la culture de la betterave. Mal connu, à peine visible, il est présent dans de nombreuses régions betteravières.

Les nématodes vivent dans les sols et se nourrissent de micro-organismes, bactéries, champignons, mais dans la plupart des cas, s'attaquent aux végétaux. Leur bouche à l'avant contient un stylet, aiguille creuse, que l'animal enfonce dans les tissus végétaux. Le produit des glandes digestives du parasite est injecté dans le contenu cellulaire. La totalité, pré-digérée, est aspirée par le nématode. La cellule racinaire meurt et devient un terrain propice au développement des parasites secondaires, bactéries, champignons, ravageurs souterrains.

### > Symptômes

Les feuilles des betteraves flétrissent par foyers lors des périodes chaudes de la journée.



Les feuilles jaunissent et donnent l'aspect d'une carence en magnésium avec le noircissement du bord. Des champignons s'installent sur les feuilles (alternaria). Les racines secondaires de la betterave prolifèrent sous l'aspect d'un chevelu sur lequel on peut observer à l'œil nu ou à la loupe les kystes. Les pertes de rendement sont proportionnelles à l'intensité de l'infestation. Elles peuvent être de l'ordre de 50% lors de fortes attaques.

### > Plantes Hôtes

**Espèces cultivées :** Betteraves, Epinard, Choux et colza

**Cultures intermédiaires :** Moutarde blanche, radis fourragers, certaines légumineuses

**Adventices :** Chénopodes, Amarantes, Sanves, Ravenelles, Renouées, Mouron blanc...

## Le Rhizoctone brun

[Rhizoctonia Solani]

Le Rhizoctone brun est une maladie due à un champignon du sol, qui se développe par ronds dans les champs. Sa propagation est favorisée par certaines rotations, par le tassement du sol, une humidité excessive et des températures élevées.

### > Symptômes

Les premiers symptômes apparaissent dès le mois de juin. Le feuillage des plantes malades, groupées en foyers, flétrit puis se nécrose partiellement ou totalement suite à la destruction de la racine. Au niveau des racines, on observe de la pourriture brune, en surface ou en profondeur, selon l'importance de la maladie.

### > Conséquences

- Pertes en rendement et diminution de la richesse
- Diminution de la qualité industrielle
- Stockage difficile des betteraves.



### > Moyens de lutte

- Éviter les tassements du sol.
- Allonger les rotations et éviter les plantes hôtes.
- Utiliser des variétés tolérantes au rhizoctone brun
- Utiliser un fongicide homologué avant couverture du sol



PAROLE D'AGRICULTEUR > **M. DESPREZ** Polyculteur-éleveur à St Venant [62]



Vincent DESPREZ exploite une ferme de polyculture élevage de 105 ha en EARL à St VENANT [62]. Les 16 ha de betteraves de l'exploitation sont livrés à la sucrerie de LILLERS.

**FD : M. DESPREZ, comment avez-vous découvert « Courlis » ?**

VD : Nous sommes dans une région de terres très argileuses et nous apportons systématiquement du fumier avant la culture de betterave. De ce fait, je cherche des variétés plutôt riches que l'on peut arracher éventuellement en début de saison. C'est notre responsable de secteur de sucrerie qui m'a orienté en 2012 vers Courlis.

**FD : M. DESPREZ cela fait donc 2 ans que vous emblavez de la Courlis ?**

VD : Oui, effectivement c'est la deuxième année que j'exploite de la Courlis. J'en ai été tellement content l'an dernier que j'en ai repris cette année. Et je ne pense pas m'être trompé quand je vois l'aspect de la parcelle. Le feuillage est resté sain avec un seul fongicide, son développement foliaire évite les levées tardives de mauvaises herbes et elle lève très bien.



*Courlis est une variété inégalable !*




## Courlis



### Riche et productive

#### Une souplesse d'adaptation exceptionnelle

- Rendement et Richesse élevés
- Bon comportement à la montée en graines
- Peu sensible au Pseudomonas
- Vitesse de levée rapide



## Tarim



### Bon équilibre Richesse/Poids

#### Adaptée aux terres humifères

- Peu sensible à la montée en graines
- Peu sensible au Pseudomonas
- Convient aux sols avec apports importants de matières organiques ou aux sols irrigués

PAROLE D'AGRICULTEUR > **Jérémy GAILLOT** L'écaille (08)



Jérémy GAILLOT exploite en SCEA avec son frère une exploitation de 450 ha dont 108 consacrés à la betterave.

### FD : Pourquoi votre choix s'est-il porté sur la variété Belino ?

JG : Cela fait 4 ans maintenant que nous mettons de la BELINO. C'est une variété qui lève vite avec une couverture du sol rapide, c'est important dans nos terres blanches cela évite le re-salissement.

### FD : Quelles sont les autres raisons de votre choix ?

JG : Dans notre région, les variétés riches ne sont pas adaptées. Nous cherchons des variétés à hauts rendements. Dès la première année d'utilisation de Belino nous avons été satisfaits et cela s'est répété les années suivantes. Nous apprécions la stabilité d'une variété d'une année sur l'autre car nous devons assurer notre revenu.



*Belino offre un haut rendement et une bonne levée*



## Belino



### *Au sommet de votre revenu !*

#### Rendement racine élevé

- Couverture du sol rapide
- Peu sensible à la montée en graines
- Peu sensible au Pseudomonas
- Bon comportement vis à vis des maladies du feuillage



## Cigogne



### *La production assurée !*

#### Revenu financier élevé

- Couverture du sol rapide
- Peu sensible à la montée en graines
- Peu sensible au Pseudomonas
- Bon comportement vis à vis de la cercosporiose

## 2 nouveautés cette année !

**2017 : c'est la suppression des quotas.**

**2018 : c'est la mise en place de l'écophyto.**

Les outils de sélection tels que le génotypage et le phénotypage de la betterave permettent de réduire le temps pour élaborer les nouveaux hybrides.

Le progrès génétique est transféré chaque année dans de nouvelles variétés pour en faire profiter tout de suite la filière betterave sucre.

**Bernache** et **Garrot** bénéficient de cette évolution génétique.



NOUVEAUTÉ  
2014



## Bernache



### Relève les défis !

#### Revenu financier très élevé

- Couverture du sol rapide
- Peu sensible à la montée en graines
- Peu sensible au Pseudomonas
- Très bon comportement vis à vis de la cercosporiose et de l'oïdium

NOUVEAUTÉ  
2014



## Garrot



### Très riche !

#### Le revenu par la richesse

- S'adapte aux terres humifères ou irriguées
- Peu sensible à la montée en graines
- Peu sensible au Pseudomonas
- Excellent comportement vis à vis de l'oïdium





## BETTERAVE SUCRIÈRE

# des variétés ada


## EMBLAVEMENT PRÉVISIONNEL 2014

[illegible]

## VARIÉTÉS

# RICHES

## Tolérante à la rhizomanie



Garrot

**Très riche !**

## Le revenu par la richesse

Retrouvez toute  
l'information technique  
de nos variétés sur  
**[www.florimond-desprez.com](http://www.florimond-desprez.com)**



**Tolérante à la rhizomanie  
et aux nématodes à kystes**



## Mainate

## L'anti-nématodes riche !

Adaptée aux terres humifères  
ou irriguées

**Tolérante à la rhizomanie  
et au rhizoctone brun**



## Muraille

***Riche et se moque  
du rhizoctone Brun !***

Le bon équilibre poids/richeesse,  
avec un bon comportement  
vis-à-vis de la cercosporiose.





## VARIÉTÉS

### ÉQUILIBRÉES

Tolérantes à la rhizomanie



#### Courlis

***Riche et très productive !***

Une souplesse d'adaptation exceptionnelle



#### Tarim

***L'équilibre Poids/Richesse***

Adaptée aux terres riches en matières organiques ou aux terres irriguées

Tolérante à la rhizomanie et aux nématodes à kystes



#### Perruche

***Se moque des nématodes !***

Bonne productivité en sol sain comme en sol infesté

Tolérante à la rhizomanie et au rhizoctone brun



#### Courtine

***Un rempart efficace !***

Bonne productivité

## VARIÉTÉS

### TENDANCE LOURDE

Tolérantes à la rhizomanie



#### Belino

***Au sommet de votre revenu !***


Rendement racine élevé



#### Cigogne

***La productivité assurée !***

Revenu financier élevé




#### Bernache

***Relève les défis !***

Revenu financier très élevé

NOUVEAUTÉ 2014

Tolérante à la rhizomanie et aux nématodes à kystes




#### Loriquet

***En tête de la course !***

Très haut rendement en toutes situations d'infestations

NOUVEAUTÉ 2014

Tolérante à la rhizomanie et au rhizoctone brun



#### Tourelle

***La tolérance et la productivité associées !***

Revenu financier très élevé

NOUVEAUTÉ 2014

NOUVEAUTÉ  
2014

## Loriquet

*En tête de la course !*

**Très haut rendement  
en toute situation d'infestation**

- Couverture rapide du sol
- Peu sensible à la montée en graines
- Peu sensible au Pseudomonas



## Mainate

*L'anti-nématodes riche !*

**Variété riche**

- Très bonne productivité en terrain sain ou infesté
- Peu sensible à la montée en graines
- Peu sensible au Pseudomonas



## Perruche

*Se moque du nématode*

**Bonne productivité  
en terrain sain ou infesté**

- Peu sensible à la montée en graines
- Peu sensible au Pseudomonas





PAROLE D'AGRICULTEUR > **Joseph MEYER** - MITTELSCHAEFFOLSHEIM (Stasbourg)



Nous avons rencontré Joseph MEYER associé d'exploitation de l'EARL MEYER à MITTELSCHAEFFOLSHEIM (Stasbourg). L'EARL MEYER exploite une ferme de polyculture élevage de 70 ha dont 12 ha de betterave. Les betteraves sont livrées à la sucrerie d'ERSTEIN.

### FD : Quel est le type d'assolement de votre exploitation ?

JM : Dans notre région c'est le maïs grain qui domine. Régulièrement nous semons de la betterave derrière un maïs nous essayons d'introduire un blé dans la rotation, mais l'an dernier par exemple tous les blés ont été gelés, nous avons donc ressemé du maïs. Et bien sûr avec de telles rotations nous avons le problème du Rhizoctone. C'est pourquoi nous utilisons 100 % de variétés tolérantes au rhizoctone brun et cela depuis 10 ans.

### FD : Vous nous avez dit que vous aviez un élevage de volaille, vous produisez donc de la matière Organique.

JM : Oui bien sûr et nous devons la gérer. Avec une variété comme Courtine qui est bien équilibrée en Poids et Richesse nous arrivons à faire d'excellents rendements.



**Courtine procure un excellent rendement !**



## Courtine

### Un rempart efficace

#### Très bonne productivité

- Très bonne tolérance au rhizoctone
- Très bon équilibre Poids-Richesse
- Peu sensible à la montée en graines
- Peu sensible au Pseudomonas



## Tourelle


### Tolérance et productivité associée

#### Revenu financier très élevé

- Excellente tolérance au rhizoctone
- Rendement racine élevé
- Couverture du sol rapide
- Peu sensible à la montée en graines
- Peu sensible au Pseudomonas



NOUVEAUTÉ  
2014



## Ce qu'il faut retenir :

### > CHOIX DES VARIÉTÉS

Le choix du type de variété dépendra surtout de l'élevage pratiqué :

#### Vaches laitières :

on choisira plutôt des fourragères et fourragères-sucrières.

Il est possible d'utiliser des sucrières-fourragères dans le cadre d'une ration préparée au moyen d'une mélangeuse hacheuse.

#### Bovins à l'engraissement, moutons, porcs :

variétés fourragères-sucrières et sucrières-fourragères conseillées.

### > RÉCOLTE ET STOCKAGE

- Récolter des betteraves propres, saines et non décollées.
- Stocker en silos aérés.
- Protéger contre le gel à partir de -5°C avec une bâche noire (ensilage)
- Le pâturage est une solution économique et pratique en zones non gélives.


Les variétés Florimond DESPREZ sont mécanisables de l'arrachage jusqu'à la distribution.



## LES VARIÉTÉS MONOGERMES

Les variétés monogermes sont classées en 3 catégories en fonction de leur pourcentage de matière sèche (MS).

| Type de variété       | % matières sèches | Proportion de racines dans le sol |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Fourragères           | - de 12 %         | 1/3                               |
| Fourragères-sucrières | 12 à 16 %         | 1/2                               |
| Sucrières-fourragères | + de 16 %         | 2/3                               |



## Classiques

|                  | FORME                                 |  | Teneur (MS) matière sèche soluble |                                         |
|------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Monro</b>     | Ovoïde peu enterrée                   |  | 13 à 14%                          | Gros tonnages assurés                   |
| <b>Jamon</b>     | Cylindro-conique moyennement enterrée |  | 15 à 16%                          | La plus polyvalente d'utilisation       |
| <b>Splendide</b> | Cônique enterrée                      |  | 16 à 17%                          | Une des meilleures en tonnage de MS /Ha |
| <b>Vernon</b>    | Cônique moyennement enterrée          |  | 16 à 17%                          | Une blanche riche en MS                 |

## Tolérantes à la rhizomanie

|                | FORME                                 |  | Teneur (MS) matière sèche soluble |                                    |
|----------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Starmon</b> | Cônique moyennement enterrée          |  | 17 à 18%                          | incontournable en zone rhizomaniée |
| <b>Caribou</b> | Cylindro-conique moyennement enterrée |  | 16 à 17%                          | Un plus en production de MS /Ha    |

NOUVEAUTÉ 2014

## Tolérantes au rhizoctone brun

|                | FORME                                 |  | Teneur (MS) matière sèche soluble |                                                 |
|----------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Monbrun</b> | Cylindro-conique moyennement enterrée |  | 15 à 16%                          | La réponse au rhizoctone brun                   |
| <b>Brunium</b> | Cylindro-conique moyennement enterrée |  | 16 à 17%                          | Un plus dans la lutte contre le rhizoctone brun |

NOUVEAUTÉ 2014



## L'utilisation de la chicorée dans le monde



**97%  
DE JUS**

**74 %** D'EAU

**26 %** DE MS SOLUBLE  
À 60°C

**3 %** DE MS NON SOLUBLE



Fructose,  
Glucose,  
Saccharose,  
Fructosucres,  
Inuline



L'espèce chicorée est sensible au froid en période de levée et au stress en végétation. Cela peut engendrer des montées en graines en cas de semis précoce.



### Orchies

Rendement racines

Matière sèche

**BON**

**BON**

La variété la plus cultivée dans le monde

### Selenite

**TRÈS BON**

**TRÈS BON**

Inscrite dans les trois pays européens producteurs de chicorée

### Obsidienne

**EXCELLENT**

**TRÈS BON**

Inscrite en 2013 : la performance dans tous les critères

### Malachite

NOUVEAUTÉ  
2014

**TRÈS BON**

**TRÈS BON**

Variété riche de qualité interne élevée à très élevée

### Chrysolite

S.U.  
TOLÉRANTE

**BON**


**BON**

La seule variété tolérante aux Sulfonyl-Urées autorisées

La possibilité d'utiliser le « Coursus » dans un programme de désherbage de la chicorée confère un grand avantage à Chrysolite (S.U. tolérante) tout particulièrement en présence d'armoise ou de sennebière (votre conseiller désherbage pourra vous préciser les doses à appliquer).

## Ne rien négliger pour optimiser la population

- La structure du sol.
- L'humidité du sol au niveau de la semence. Attention au dessèchement de surface !
- La température du sol. La t° de départ de germination se situe à « +/- 5° ».



- L'oxygène dans l'environnement de la semence. « porosité de la terre de recouvrement ».
- La protection de la plantule contre les parasites.



## Ne pas oublier !

- L'entretien du semoir : socs, disques distributeurs, tuyauterie, usure des bandages et grattoirs...).



- Vérifier l'alignement des organes de recouvrement et de plombage par rapport aux socs.



## Mais aussi !

- Évaluer le ressuyage du sol en surface pour engager la préparation
- En non labour le ressuyage est souvent plus lent.
- Équiper le tracteur de pneumatiques pour limiter le tassement.



## Réussir un semis de précision !


- Sur un sol suffisamment ressuyé et rappuyé :
  - À une vitesse d'avancement limitée.
  - À une profondeur entre 1,5 et 2,5 maximum.



## Conseil :

Plomber la graine pour qu'elle soit en contact avec le sol et provoquer la remontée de l'humidité par capillarité.





## La commercialisation des semences de betterave est soumise à la réglementation de la directive 2002/54/CE du 13 juin 2002

Les semences mono germes sont gérées par lot d'un poids maximum de 20T ou 10 000 unités (tolérance 5 %) puis conditionnées dans des emballages contenant 100 000 graines à  $\pm 5\%$  étiquetés avec les références officielles obligatoires : N° du lot, mois et année de fermeture, mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillon en vue de la certification, l'espèce, le nom de la variété, la catégorie, le pays de production, les protections sur la semence...

Les normes de germination décrites dans la directive sont : faculté germinative minimale 80 % à Température 15-25°C pendant 10 jours et 90 % des semences doivent donner une seule plantule.

Toutes les semences Florimond DESPREZ commercialisées ont un pouvoir germinatif supérieur à 95 % et une monogermie supérieure à 95 %.

PLUS DE  
**10**  
tests

Plus de 10 tests de génotypage ou de germination sont effectués sur chaque lot commercial

## Chaque étape de la production de semences est contrôlée.

### GÉNOTYPAGE

- **SEMENCES DE BASE**  
Vérification sans OGM.
- **PLANCHONS (PARENTS)**  
Test de transfert de tolérance.
- **POST RÉCOLTE DES SEMENCES, SUR PLANTE LEVÉE EN SERRE**  
Vérification des différents transferts.



### TESTS DE GERMINATION



- **RÉCOLTE**
- **POLISSAGE DES GRAINES**
- **CALIBRAGE**
- **ACTIVATION START'UP**
- **ASSEMBLAGE DES LOTS D'ORIGINE**
- **ENROBAGE**
- **PROTECTION DE LA SEMENCE**
- **MISE EN BOÎTE**

### GÉNÉRALITÉS

- **TRAÇABILITÉ**  
Conduite agronomique des champs de multiplication suivant un cahier des charges (irrigation, protection parasitaire...).
- **TEST DE SEMABILITÉ**  
sur banc d'essai.
- **CONTRÔLES A POSTÉRIORI**  
en serre puis au champ des levées et de la montée en graines.



### Conseils :

- Conserver les graines de report dans un emballage d'origine au sec et au froid
- Avant le semis de semences de report Florimond Desprez, confiez-nous un échantillon de graines (200 à 300 graines) pour un test de germination.


# Un rayonnement international



Florimond Desprez continue à développer son savoir-faire à l'international en étant présent dans toutes les zones de production agricole où le marché des semences connaît une forte croissance. Déjà implantée dans le bassin méditerranéen (Espagne, Italie, Maroc), l'entreprise poursuit son développement en Amérique du Sud (Argentine), dans les pays d'Europe Centrale et en Russie.

Actuellement, Florimond Desprez détient 10 filiales directes à l'étranger et réalise 65 % de son chiffre d'affaires hors de France.

**François Desprez,**  
Président de Maison Florimond Desprez



● Filiales ou Implantations

● Partenaires commerciaux

## NOTRE SÉLECTION, VOS VARIÉTÉS



**FLORIMOND  
DESPREZ**